

Profil de la pathologie dermatologique du sujet âgé

1^{er} Auteur : Amel, CHABBOUH, résidente, Dermatologie, Hôpital militaire principal d’instruction, Tunis, TUNISIE

Autres auteurs, équipe:

- Faten, RABHI, assistante, Dermatologie, Hôpital militaire principal d’instruction, Tunis, TUNISIE
- Lina, BESSAAD, résidente, Dermatologie, Hôpital militaire principal d’instruction, Tunis, TUNISIE
- Malek, BEN SLIMENE, assistante, Dermatologie, Hôpital militaire principal d’instruction, Tunis, TUNISIE
- Kahena, JABER, Professeure, Dermatologie, Hôpital militaire principal d’instruction, Tunis, TUNISIE
- Abderaouf, DHAOUI, Professeur, Dermatologie, Hôpital militaire principal d’instruction, Tunis, TUNISIE

Introduction

Les dermatoses gériatriques représentent un défi pour le médecin en termes de diagnostic, de gestion et de suivi. L’objectif de ce travail était d’étudier le profil des pathologies dermatologiques touchant les sujets âgés.

Résultats

Nous avons inclus 821 cas. Le sex-ratio (H/F) était 1.14. En considérant les groupes de pathologies, les patients sont répartis selon la figure 1. En prenant en considération les diagnostics, la répartition des patients est représentée par la figure 2. En considérant les groupes d’âges, les patients sont répartis selon la figure 3. En fonction des saisons, les infections mycosiques prédominaient en printemps (n=38, 18,2%), en été (n=54, 23,4%) et en automne (n=40, 20%) et le prurit en hiver (n=31, 14%).

Méthodes

Nous rapportons tous les cas de sujets de plus de 65ans ayant consulté au service de dermatologie entre janvier 2017 et décembre 2021. Nous avons étudié la fréquence des pathologies et syndromes et leur répartition en fonction de l’âge, et la saison.




Figure 1: Répartition en fonction des groupes de pathologies




Figure 3: Répartition en fonction des groupes d’âges




Figure 2: Répartition en fonction des diagnostics les plus fréquents

Conclusion

Sous l’effet du vieillissement intrinsèque et extrinsèque, la population gériatrique présente des caractéristiques propres à cette tranche d’âge. Au fur et à mesure que l’âge avance, les infections mycosiques fréquentes à partir de 65 ans laissent place à la xérose cutanée, aux dermatoses eczématiformes et à la pathologie vasculaire.