

PROFIL CUTANÉO-MUQUEUX AU COURS DU LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE

- **Kechaou Ines, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE**
- Tekaya Asma, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Hamdi Mohamed Salah, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Jebri Mariem, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Benelhaj Wiem, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Boukhris Imen, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Azzabi Samira, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Cherif Eya, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Ben Hassine Lamia, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE

Introduction

Les manifestations cutanéomuqueuses au cours du lupus érythémateux systémique (LES) sont fréquentes et polymorphes quel que soit la sévérité de la maladie. Le but de notre travail était de décrire ces manifestations au cours du LES.

Méthodes

Etude rétrospective descriptive incluant 91 patients ayant un LES colligés dans un service de médecine interne sur une période de 17 ans entre 2006 et 2023. Le diagnostic de LES a été retenu selon les critères de l'ACR 1997.

Résultats

Epidémiologie [figure 1]

Patients lupiques	91
Atteinte cutanée (%)	70 (76,9%)
Genre ratio F/H	16,5
Age moyen (ans)	35,5
Extrêmes d'âge (ans)	14-74

Figure 1 : Epidémiologie de l'atteinte cutanée au cours du LES

Siège des lésions cutanées [figure 2]




Figure 2 : Sièges de l'atteinte cutanée au cours du LES

Manifestations cutanées [figure 3]




Figure 2 : Manifestations cutanées au cours du LES

Biopsie cutanée (14,3%) :

Si manifestations cutanées atypiques ++

Immunologie :

AAN étaient fortement positifs : 58 cas (82,9%)

Manifestations associées [figure 4]




Figure 4 : Manifestations extra-cutanées

Pathologies auto-immunes associées :

➤ Syndrome de Sjögren : 11 cas

➤ SAPL : 6 cas

➤ Sclérodémie systémique : 1 cas

Conclusion

Notre étude se caractérise par le polymorphisme de l'atteinte cutanéomuqueuse. Toutefois, une biopsie cutanée reste nécessaire en cas de lésion atypique pour orienter l'enquête étiologique.

Pas de conflits d'intérêt