

## Maladie de Behçet : Quelle différence entre Homme et Femme ?

W. Khemiri, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 O. Dhrif, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 R. Bourguiba, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 W. Helali, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 H. Bettaieb, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 M. Boudokhane, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 MH. Douggui, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie  
 S. Bellakhal, Médecine interne, Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Marsa, Tunisie

### ➤ Introduction :

▪ La maladie de Behçet est une vascularite fréquente dans le bassin méditerranéen touchant principalement le sexe masculin.


**Objectif du travail:** comparer les profils épidémiocliniques de la maladie chez les patients hommes et femmes.

### ➤ Méthodologie:

- Nous avons mené une étude monocentrique, rétrospective et comparative incluant tous les patients suivis pour maladie de Behçet sur une période de 9 ans [Janvier 2014-Aout 2023].
- Les patients ont été comparés selon le genre
- Les données ont été saisies et analysées par le logiciel SPSS dans sa version 26.

### ➤ Résultats:

Au total, 42 patients ont été inclus avec un âge moyen de 43±12ans pour les hommes et 48±14 ans pour les femmes (p=0,38).



	Homme	Femme	p
Arthralgies	66%	58%	0,28
Aphose bipolaire	56%	58%	0,92
Pseudofolliculite	70%	33%	0,17
Thrombose veineuse profonde	24%	8%	0,4
Thrombose veineuse cérébrale	0%	20%	0,07

### NeuroBehçet :

↳ Prédominance des céphalées dans le sexe féminin (p=0,017).

↳ Prédominance du syndrome pyramidal dans le sexe féminin (p=0,071).

	Homme	Femme	p
Uvélite antérieure	0%	25%	0,019
Vascularite rétinienne	23%	8%	0,4
NeuroBehçet	10%	33%	0,08

### Traitement:

	Corticoïde	Imurel	Cyclophosphamide	Anti-TNF
Homme	80%	43%	10%	17%
Femme	67%	16%	0%	8%
p	0,43	0,15	0,3	0,65

### ➤ Conclusion:

Notre étude a montré une présentation similaire entre le sexe masculin et le sexe féminin pour les principales atteintes au cours de la maladie de Behçet.

