

Atteinte ophtalmologique exceptionnelle au cours de la PR

- wafa, SKOURI, AHU, médecine interne, HMTM, Nabeul, TUNISIE
- roua, MANKAI, Résidente, médecine interne, HMTM, Nabeul, TUNISIE
- haifa, TOUNSI, AHU, médecine interne, HMTM, Nabeul, TUNISIE
- jaafar, OUNI, AHU, ophtalmologie, HMTM, Nabeul, TUNISIE
- wafa , GARBOUJ , spécialiste , médecine interne, HMTM, Nabeul, TUNISIE
- raja , AMRI , Pr ag , médecine interne, HMTM, Nabeul, TUNISIE

Introduction:

L'atteinte oculaire n'est présente que dans 25% des cas de polyarthrite rhumatoïde (PR) dominée par la sclérite, épisclérite et le syndrome sec oculaire. L'ulcère cornéen marginal révélateur de cette pathologie n'est décrit que rarement. Nous rapportons une nouvelle observation.

Observation:

Il s'agit d'un homme âgé de 61 ans, sans antécédents médicaux, admis dans notre service pour prise en charge d'un syndrome inflammatoire biologique persistant. A l'interrogatoire, il avait des polyarthralgies inflammatoires des grosses et des petites articulations évoluant depuis 2 ans associées à une xérostomie et une xérophtalmie ainsi qu'une rougeur oculaire récurrente mal explorée. L'examen physique était normal. La biologie n'a pas montré d'autres anomalies en dehors du syndrome inflammatoire biologique. L'examen ophtalmologique a mis en évidence un amincissement stromale périphérique compatible avec un ulcère marginal bilatéral ancien. Les enquêtes néoplasique et infectieuse étaient négatives.

Le bilan immunologique a montré des anticorps anti nucléaires positifs à 1/400 mouchetés, le facteur rhumatoïde et les anti CCP étaient positifs. Le diagnostic de PR était retenu. Le patient était classé selon les critères ACR EULAR 2010 en ayant 6 points. Le reste du bilan lésionnel était négatif. Pas de maladies auto-immunes associées. Il a été traité par méthotrexate et acide folique avec une bonne évolution.

Discussion:

L'ulcère marginal cornéen est le plus souvent d'étiologie inflammatoire. Il peut précéder le diagnostic de la maladie en cause. Dans le cas de notre patient, le caractère ancien est en faveur de cette éventualité

Conclusion:

Les manifestations oculaires révélatrices de la PR, bien que rares, mais existent incitant à un examen ophtalmologique minutieux et à une concertation multidisciplinaire étroite afin d'éviter des complications graves.

