

CARACTÉRISTIQUES DE L'ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET

- Tekaya Asma, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Hamdi Mohamed Salah, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Kechaou Ines, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Jebri Mariem, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Cherif Eya, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Azzabi Samira, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Boukhris Imen, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Hariz Anis, Docteur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE
- Ben Hassine Lamia, Professeur, Service de médecine interne B, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE

Introduction

L'atteinte oculaire représente l'une des principales manifestations de la maladie de Behçet (MB). Il s'agit d'une atteinte redoutable pouvant mettre en jeu du pronostic visuel.

L'objectif de notre travail était de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives de l'atteinte oculaire au cours de cette pathologie.

Méthodologie

Etude rétrospective descriptive incluant les patients présentant une MB avec atteinte oculaire suivis dans un service de médecine interne.

Résultats

• Epidémiologie [Tableau I]

Tableau I : Données épidémiologiques

Maladie de Behçet	47
Atteinte cutané-muqueuse	48,9%
Inaugurale de la MB	40,4%
Genre ratio H/F	10,5
Age moyen (ans)	39.6 ± 14.5
Extrêmes d'âges (ans)	19 - 60

• Manifestations oculaires [figure 1]




Figure 1 : Manifestations oculaires de la MB

- Atteinte bilatérale : 73.9 %
- Nombre moyen de poussées oculaires : 2.6 par patient [1-10].

• Traitement [Tableau II, figure 2]

Tableau II : Moyens thérapeutiques utilisés

Colchicine	100%
Corticoïdes	95,6%
Immunosuppresseurs	87%

- Immunosuppresseurs :
 - Azathioprine : 55%
 - Cyclophosphamide relayé par l'azathioprine : 45%
- L'infliximab était ultérieurement prescrit chez 2 patients pour une uvéite réfractaire.

• Evolution sous traitement :

- Favorable : 52.2%
- Rechutes : 30.4%
- Complications : [figure 2]




Figure 2 : Complications de l'atteinte oculaires

Conclusion

Notre étude retrouve une fréquence élevée des complications de l'atteinte oculaire au cours de la MB s'alignant ainsi aux données de la littérature concernant la sévérité de cette atteinte. Cette constatation souligne l'importance cruciale d'une prise en charge rapide et efficace de cette atteinte afin de minimiser le risque de complications graves et en particulier de cécité.