

Etiologies des nécroses digitales en médecine interne

I. Rachdi (1) ; A. Soli (1) ; M. Somaï (1) ; F. Daoud (1) ; B. Ben Dhaou (1) ; Z. Aydi (1) ; F. Boussema (1)
(1) Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

Introduction :

- Les nécroses digitales (ND) représentent un motif de consultation fréquent en médecine interne.
- Le défi majeur du clinicien est de trouver la pathologie sous-jacente vu les implications thérapeutiques et pronostiques.
- L'objectif de notre travail était de décrire les différentes étiologies des ND en médecine interne.

Patients et méthodes :

- Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive portant sur 32 cas de ND colligés dans un service de médecine interne sur une période de cinq ans.
- Le recueil des données a été fait à partir des dossiers médicaux des patients.

Résultats :

- Nous avons colligé 32 patients
- Le sex-ratio (H/F) à 1,66
- L'âge moyen au moment de la survenue de la ND était de 46,9 ans [14;74].
- Dix-neuf patients étaient tabagiques.
- Les antécédents de maladies cardio-vasculaires étaient :
 - Hypertension artérielle (n=10)
 - Dyslipidémie (n=5)
 - Diabète (n=4)
 - Obésité (n=6)
- Les ND avaient intéressé les doigts dans 23 cas et les orteils dans 11 cas.
- Le diagnostic étiologique était porté chez 30 patients.




Figure1 : Profil étiologiques des nécroses digitales

- Le traitement était :

- Symptomatique dans tous les cas
- Etiologique dans cinq cas secondaires au cancer de la thyroïde, aux causes infectieuses, et à l'iatrogénie des bêta bloquants.
- Une amputation était réalisée chez cinq patients.

Conclusion :

- La ND constitue un symptôme commun à plusieurs pathologies.
- Bien que les connectivites constituent l'étiologie la plus fréquente, il serait recommandé d'éliminer les autres causes infectieuses et néoplasiques, potentiellement réversibles chez ces patients.

