

Vaccination anti-covid : Est-ce que les médecins en formation intègrent les dernières recommandations médicales dans leur pratique clinique ?

Rihab FEJJI (1); Safa RAHMOUNI (1) ; Khaoula ZOUAOUI (1) ; Maïssa ABBES (1) ; Soumaya BOUSSAID (1) ; Sonia REKIK (1) ; Hela SAHLI (1) ; Mohammed ELLEUCH (1)

(1) Service de rhumatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction:

- Les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques et sous traitement immunosuppresseur sont considérés comme étant à haut risque de complications graves liées au Covid-19.
- Ces derniers doivent recevoir des conseils et des informations claires sur les précautions à prendre et le moment optimal de la vaccination.

Objectif: Evaluer les connaissances et les attitudes des résidents en rhumatologie (RTO) et en médecine de famille (MDF) sur la conduite à tenir en cas de vaccination anticovid chez ces patients.

Matériels et méthodes:

- Une enquête de 11 questions:
 - Huit questions générales
 - Trois questions sur le moment optimal pour la vaccination contre le COVID-19 en cas de prise du [méthotrexate](#), [corticoïdes](#) ou [anti TNF](#)
- Auto-administrée à travers internet et élaborée via Google-Forms, menée auprès des MDF et des RTO tunisiens, au cours du mois de mai 2023.
- Vers la fin du questionnaire, les bonnes réponses ont été fournies ainsi que les références [1-2].

Résultats:

- ✓ Notre étude a inclus 41 médecins réparti entre 23 rhumatologues et 18 MDF
- ✓ Sex-ratio H/F=0,17
- ✓ Age moyen des participants: 28 ans [25–32 ans].




Figure 1 : Fréquence de consultations quotidienne de patients

Concernant les patients sous Méthotrexate




Figure 2 : Avis des médecins sur la conduite en cas de prise de Méthotrexate

Concernant les patients sous corticothérapie




Figure 3 : Avis des médecins sur la conduite en cas de prise des Corticoïdes

Concernant les patients sous les anti TNF




Figure 4 : Avis des médecins sur la conduite en cas de prise des anti-TNF

Recommandations:

- ❖ Sous **méthotrexate**, il est recommandé de s'abstenir pendant 1 à 2 semaines si l'activité de la maladie le permet après chaque Dose de vaccin COVID-19
- ❑ Si la dose de **corticoïdes** est inferieur a 20mg /j, aucune modification du traitement immunomodulateur ou du calendrier de vaccination
- ❑ Si la dose de **corticoïdes** est supérieure à 20mg /j d'équivalent prednisone, Il n'y a pas de consensus sur le calendrier de vaccination.
- ❑ Pas de consensus s'il faut ou non interrompre temporairement les **anti TNF** après chaque dose de vaccin COVID-19.

Conclusion:

- En se basant sur les recommandations les plus récentes de l'ACR, nous avons relevé des lacunes dans les connaissances des médecins en formation aussi bien en rhumatologie qu'en médecine de famille concernant l'attitude en cas de vaccination anti-covid.
- Ces recommandations sont régulièrement mises à jour, et les médecins de première ligne et les rhumatologues doivent les observer et les intégrer dans leur pratique courante afin de garantir une prise en charge optimale des patients sous traitement au long cours.

1. covid-19-vaccine-clinical-guidance-rheumatic-diseases-summary.pdf
2. covid-19-recommandation-pour-vaccins-arnm-120121.pdf