

Motifs d'admission des sujets âgés dans un service de médecine interne : A propos de 301 cas

W. Romdhane (1) ; I. Ben Hassine (1) ; J. Anoun (1) ; W. Baya (1) ; N. Adaily (1) ; M. Karmani (1) ; A. Mzabi (1) ; F. Ben Fredj (1)
(1) Médecine Interne, Hôpital Universitaire Sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction

• Les motifs d'admission des personnes âgées sont divers.

➔ L'objectif de notre travail était d'identifier les différents motifs d'admission des patients âgés hospitalisés au service de médecine interne.

Patients et méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive de 301 dossiers des patients âgés > 65 ans admis au service de médecine interne durant la période allant du 1er Janvier 2020 jusqu'au 31 Aout 2023.

Résultats

➤ Nous avons colligés 301 patients. L'âge moyen au moment du diagnostic était de $74,52 \pm 6,67$ ans avec des extrêmes allant de 65 à 93 ans et avec un genre ratio H/F=0,94.

➤ **Les symptômes prédominants** : une fièvre (55 cas), asthénie (43 cas), des signes urinaires (43 cas), des signes respiratoires (41 cas), un amaigrissement (32 cas), des céphalées (19 cas), des polyarthralgies (17 cas), des adénopathies (14 cas), des myalgies (12 cas), des troubles dépressifs (9 cas), des troubles de comportement (6 cas), des troubles de la marche (5 cas), un refus alimentaire (3 cas) et des douleurs osseuses (3 cas) (Figure 1)




Figure 1 : Répartition des symptômes

➤ **Les étiologies** étaient dominées par les **causes infectieuses** (44,8%) suivies par les **pathologies thrombo-emboliques** (12,6 %) ainsi que les **néoplasies** (14 %) puis les **endocrinopathies** (7 cas d'hyperparathyroïdie et 4 cas d'hypothyroïdie) et les **anémies mégaloblastiques** (6,6%).

➤ **Les causes infectieuses** étaient dominées par les **dermohypodermes infectieuses non nécrosantes** (45 cas) puis les **pyélonéphrites aiguës** (42 cas) enfin les **broncho-pneumopathies** (37 cas) essentiellement à germes atypiques.

➤ La maladie de Horton était la pathologie systémique la plus fréquente suivie par la **sarcoïdose**.

➤ **Les néoplasies** les plus fréquemment diagnostiquées étaient : le **myélome multiple** (10 cas), le **cancer pulmonaire** (7 cas) suivi par le **cortico-surréalome** (5 cas), le **lymphome** (5 cas), le **cancer de la prostate** (5 cas) et un **sarcome osseux** (1 cas).

Conclusion

La prise en charge du patient âgé repose sur une démarche globale qui prend en compte les particularités sémiologiques et les risques de décompensation fonctionnelle.

Elle assure une prévention des complications médicales et psychologiques ainsi que de la perte d'autonomie.

